


IBal: Mallorca, r, BARC., DUVIGN., etc. [n.v.]; Menorca, ROD. FEM. [n.v.]; Eivissa, DUVIGN. [n.v.]; Cabrera, P. PALAU. 0-600 m.¹ — Latemed.

3009(1). **G. italicus** Mill. (*G. segetum* Ker-Gawler)

lliri dels blats

- 1' *Anteres de 6,5-13 mm, més curtes que el filament (o, rarament de longitud quasi igual); granes alades. Semblant a l'espècie precedent; anteres amb orelletes divergents o no; estigmes sovint amb la part inferior filiforme i la superior dilatada; càpsula obovoide. G.b. 2-10 dm. III-VI.*



Garrigues, erms, etc.; molt rarament en indrets herbosos humits. Regió mediterrània, principalment a les terres marítimes. — Pluriereg. holàrt.: Med.-Atl.-Pòntic.

3010(2). **G. communis** L.

- A. Planta ordinàriament de 25-50 cm; fulles de 10-40 × 0,4-1(1,2) cm; espigues de 3-10 flors, generalment no ramificades; segments periantics de 25-40 × 0,6-1,6 mm; estigma, en general, amb la part inferior filiforme i la superior dilatada.

Garrigues, erms (*Rosmarino-Ericion*, *Thero-Brachypodieta*, etc.). Regió mediterrània (dom. dels *Quercetea ilicis*), principalment a les contrades marítimes i a la baixa muntanya. **PCat:** Contrades marítimes (del Rosselló al Baix Ebre i al Matarranya), c; terr. auso-segàrric (Bages, r; Anoia, r; Conca de Barberà, r); Prepirineus C (Alta i Baixa Ribagorça, Montsec i terres veïnes, ROMO, etc. [n.v.]). 0-1200 m. **PVal:** Terr. catalanídic N (l'Alcalatén, etc.), r; terr. serrànic (Alt Palància, la Foia de Bunyol, etc.), r; terr. diànic (la Ribera Baixa, la Marina Septentrional i Meridional, etc.), r; terr. lucèntic (Alt Vinalopó, l'Alacantès, Baix Segura), rr. 0-1300 m. **IBal:** Totes les illes, r.² 0-1000 m. — Latemed.-Atl.

1) *G. italicus*: Les plantes de la Ribera Baixa, leg. BORJA, que hem vist, són *G. communis* ssp. *illyricus*. KNOCHÉ dubta de la presència de l'espècie a les IBal.

2) *G. communis* L. var. **montserratii** var. nova: Stigmatibus a base sensim dilatatis; tepalis ad 5 cm. long.; foliis latioribus (6-12 mm lat.). Typus: Binissermenya (Menorca), ubi leg. P. Font i Quer die 6-V-1913, BC 61019, specimen labello proximo. La planta de Menorca difereix apreciablement de les de la resta del territori, com assenyalà ja Pere MONTERRAT, Collect. Bot. III: 414, 1953. És una planta baixa (3-4 dm), amb fulles amples i amb els estigmes atenuats ± regularment de l'àpex a la base.

La var. **reuteri** (Boiss.) P. Cout., gràcil, amb fulles curtes i estretes, bràctees més curtes que 1/2 de la longitud del periant, flors patents, de color de rosa, etc., ha estat citada de l'Alt Palància, PAU. — Med. W: lusit.